



**¿Sabías
qué?**



Según la UNESCO, la violencia de género en el ámbito escolar es un obstáculo muy importante para la escolarización universal y el derecho de las niñas a la educación. A escala mundial, 1 de cada 3 estudiantes de 11 a 15 años han experimentado acoso escolar por parte de sus compañeros o compañeras en al menos una ocasión durante el último mes. Las niñas y los niños tienen la misma probabilidad de experimentar acoso escolar.




Según el Ministerio de Educación, la educación sexual integral tiene como finalidad que las y los estudiantes logren aprendizajes significativos para el ejercicio de una sexualidad saludable, placentera y responsable en el contexto de relaciones interpersonales, democráticas, equitativas y respetuosas.



En Perú, 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia física, sexual o psicológica por parte de sus parejas al menos una vez en su vida. *Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).*



Según ONU MUJERES, menos del 40 % de las mujeres que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda.




Según ONU MUJERES, la mayor parte de la violencia contra las mujeres es perpetrada por sus esposos, parejas íntimas, exparejas o exesposos. Más de 640 millones de mujeres de 15 años o más han sido objeto de violencia de pareja (el 26% de las mujeres de 15 años o más).



Alrededor de 50 mil niñas y adolescentes de hasta 19 años son madres en el Perú. En 2020, 1 158 menores entre 10 y 14 años experimentaron una maternidad, cifra que se incrementó en 2021 a 1 437 equivalente a un 24%. *Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).*




En Perú, cada año, casi 30
menores de 16 años se casan.
*Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA).*



En el Perú más de 56 mil adolescentes peruanas viven en matrimonios y uniones tempranas y forzadas. El 82% se da en adolescentes mujeres, proporción cuatro veces mayor que en adolescentes hombres (17%). *Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).*



En el Perú, el método anticonceptivo más utilizado por las mujeres es la inyección, seguido de las pastillas anticonceptivas. *Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2019.*



El implante hormonal subdérmico es una varilla flexible que contiene una hormona derivada de la progesterona, que evita la ovulación y hace más espeso el moco del cuello del útero, impidiendo el paso de los espermatozoides al interior del útero. *Ministerio de Salud (MINSA).*




Las y los adolescentes son elegibles para utilizar cualquier método anticonceptivo y deben tener acceso a una variedad de opciones. La edad por sí misma no constituye una razón médica para no otorgar métodos a una/un adolescente. La población adolescente, que acuda a los establecimientos de salud en busca de planificación familiar, recibirá toda la información, servicios y podrán acceder a métodos anticonceptivos totalmente gratuitos. *Ministerio de Salud (MINSA).*




Existen instituciones que realizan campañas de despistaje de ITS y brindan orientación médica y psicológica donde se puede tratar curiosidades sobre sexualidad, como AHF - Aids Healthcare Foundation Perú, quienes están en Instagram como @ahfperu.




El MINSA informa que Loreto, Amazonas, Ucayali y San Martín tienen las tasas más altas de gestantes entre los 12 y 17 años. En el Perú, 12 de cada 100 adolescentes están embarazadas o ya son madres.



Al menos 1 de cada 2 niñas y niños en América latina han sufrido al menos algún tipo de abuso. *Organización Panamericana de la Salud (OPS).*




En el año 2008, se liberaron a 14 menores de explotación sexual en Iquitos, Cusco y Madre de Dios. *Organización Internacional para las Migraciones (OIM).*



Perú ha registrado 2 611 víctimas de trata en el 2021, de las cuales un 83% son mujeres y un 25% son menores de edad. *CHS Alternativo – Capital Humano y Social.*



Según el programa Aurora de 27,402 casos de violencia sexual, el 95% corresponden a mujeres y solo el 5% a hombres.




El 45% de los casos de nuevas infecciones por el VIH a nivel mundial ocurren en personas entre 15 y 24 años. *Organización Panamericana de la Salud (OPS).*



La plataforma SíseVe contra la
Violencia Escolar, promueve
que las instituciones
educativas se articulen con los
diversos servicios que brinda el
Estado para restaurar el
bienestar y los derechos de los
niños, niñas y adolescentes
afectados por hechos de
violencia escolar. Cualquier
persona (adulto/escolar,
víctima/testigo) puede
reportar un caso de violencia
escolar en www.siseve.pe



Cualquier persona
(adulto/escolar,
víctima/testigo) puede
reportar un caso de violencia
escolar a través del
0800-76-888 o en la página
web www.siseve.pe



En 1564, el anatomista Gabriel Falopio inventó una pieza de lino que se adaptaba al glande. En plena epidemia de sífilis, el italiano probó su invento con mil hombres. Ninguno de ellos resultó contagiado después de tener relaciones sexuales. ¡Este es el primer registro que se tiene del uso de un condón!

IPAS Bolivia.




1 625 niñas menores de 14
años sufrieron embarazos
forzados. *Centro de la Mujer
Peruana Flora Tristán.*




Alrededor del 75% de estudiantes ha sido víctima de agresiones por parte de sus compañeros o compañeras alguna vez. El lugar más frecuente en el que ocurre es en el aula y durante clases. Las agresiones más comunes entre estudiantes son: insultos, burlas, uso de apodos, golpes y chismes.

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y Aids Healthcare Foundation Perú, 2018.



El bullying o acoso escolar es un problema que está lejos de dejar las aulas. Solo de enero a mayo del 2023 se han reportado 2 202 casos, según la plataforma del Ministerio de Educación, SíseVe.



Los datos de la plataforma SíseVe, del Ministerio de Educación, revelan que las denuncias mantienen un incremento sostenido en lo que respecta a violencia sexual. Solo en 2022, hubo casi 1 500 reportes, la mayoría relacionados a hostigamientos y tocamientos indebidos.



Los programas escolares han demostrado ser una manera muy eficaz en función de los costos de contribuir a la prevención del VIH y de garantizar los derechos de las y los jóvenes a la educación y a los servicios de salud sexual y reproductiva. *Kivela et al., 2013; UNESCO, 2011a; 2016c.*



Por lo menos 200 millones de mujeres y niñas que viven hoy han sido sometidas a la mutilación/ablación genital femenina en 30 países. En la mayoría de estos países la gran parte de las niñas fueron sometidas a esta práctica antes de cumplir los cinco años. *Plan internacional, 2016.*




La educación en sexualidad tiene mayor impacto cuando los programas escolares se complementan con elementos comunitarios, como la distribución de condones, la capacitación de proveedores de atención médica para que entreguen servicios, y el involucramiento de padres y docentes. *Chandra- Mouli et al., 2015; Fonner et al., 2014; UNESCO, 2015.*




Es más probable que las adolescentes embarazadas abandonen la escuela e interrumpan su educación, lo cual limita las posibilidades de un empleo futuro y otras oportunidades de la vida.

UNESCO, 2017.




A nivel mundial, cada año 3 millones de mujeres entre los 15 y 19 años de edad tienen abortos no seguros.


Organización Mundial de la Salud (OMS), 2014.




Según la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Indiana Bloomington, las personas pueden tener una infección de transmisión sexual (ITS), y ni siquiera estar conscientes de ello, ya que la mayoría son imperceptibles.




Algunas ITS como las verrugas genitales y el herpes, se contagian a través del contacto piel a piel. Además, otras ITS como la clamidia, la sífilis y la gonorrea pueden ser transmitidas por el líquido preeyaculatorio. Si vas a tener sexo, la mejor manera de protegerte de las ITS es usando condón. *Escuela de Salud Pública de la Universidad de Indiana Bloomington.*



En el Perú, las niñas y niños a partir de los 9 años tienen acceso gratuito a la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), causante de casi todos los casos de cáncer de cuello uterino. *Ministerio de Salud (MINSA).*



El examen de Papanicolaou es un procedimiento ginecológico para ayudar a prevenir y detectar temprano el cáncer de cuello uterino. Desde los 25 años, las mujeres deben practicarse el examen cada tres años. *Organización Panamericana de la Salud (OPS).*



El aborto terapéutico es legal en el Perú. Se da cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o evitar en su salud un mal grave y permanente. Sin embargo, al 2022 solo dos hospitales en el país cuentan con protocolos para el manejo de estos casos. *Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex).*